Л.И.Прищепа, кандидат биологических наук

Е.Н.Янковская, аспирантка

Белорусский НИИ защиты растений

УДК 632.937.14:632.752.1

Вирулентность местных штаммов мускардинных грибов для тепличной белокрылки (*Trialeurodes vaporariorum* Westw.)

В статье приведены результаты поиска в природных биоценозах и изучения биологических и инсектицидных свойств энтомопатогенных грибов *Metarrhizium anisopliae* (Metch) Sor. и *Paecilomyces fumoso-roseus* (Wize) Brown et Smith. В результате выделен в чистую культуру ряд местных штаммов *M. anisopliae* и *P. fumoso-roseus*. Изучены их морфолого-культуральные признаки, энтомоцидная активность по отношению к лабораторному тест-объекту (гусеницам большой вошинной моли *Galleria mellonella* L.) и к целевому объекту (личинкам тепличной белокрылки *Trialeurodes vaporariorum* Westw.). Как наиболее перспективные в качестве продуцентов биологических препаратов отобраны штаммы *P. fumoso-roseus* P97, 3/1 и 7/5. Для наиболее активного из них (штамм *P. fumoso-roseus* 3/1) определены значения среднелетальной концентрации ($ЛК_{50}$) для личинок белокрылки II-III и IV возраста.

The results of search in natural bio-coenosis and study of biological and the insecticide properties of entomo-pathogenic fungi *Metarrhizium anisopliae* (Metsch.) Sor. And *Paecilomyces fumoso-roseus* (Wize) Brown et Smith are indicated in the article. As a result the number of *M. anisopliae* and *P. fumoso-roseus* local strains is isolated. Their morphological and cultural signs, entomocidal activity in relation to the laboratory test-object (wax moth *Galleria mellonella* L. larvi) and to the target object (greenhouse whitefly *Trialeurodes vaporariorum* Wstw. larvi) are studied. As the most perspective as producer of biological preparations the strains of *P. fumoso-roseus* P97, 3/1 and 7/5 are selected. For the most active among them (the strain of *P. fumoso-roseus* 3/1) the values of medium lethal concentration (LC_{50}) for II-III and IV instar larvi are determined.

Одним из естественных регулирующих факторов численности насекомых являются эпизоотии, вызываемых различными энтомопатогенными микроорганизмами, в том числе и грибами. Патогенность для насекомых-фитофагов и способность к росту на искусственных питательных средах создают предпосылки для применения их в защите сельскохозяйственных культур от вредителей. Согласно литературным данным [4, 5, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24] инсектицидные препараты на основе таких видов энтомопатогенных грибов, как *Metarrhizium anisopliae* (Metch) Sor. (возбудитель зеленого мускардиноза) и *Paecilomyces fumoso-roseus* (Wize) Brown et Smith (возбудитель розового мускардиноза) (кл. Deuteromycetes, пор. Moniliales, сем. Moniliaceae) широко применяются в практике защиты растений за рубежом. Известно лишь одно сообщение о выделении указанных видов грибов на территории Беларуси [11]. Направленное же изучение возможности их практического использования до настоящего времени не проводилось.

В 1997 г. из почвы (Минский р-н, д. Прилуки) были выделены штаммы *M. anisopliae* П97 и *P. fumoso-roseus* П97. Видовая принадлежность подтверждена специалистами Института экологии Польской академии наук. С использованием этих двух штаммов в 1998 г. была проведена оценка чувствительности некоторых вредителей защищенного грунта (тепличная белокрылка *Trialeurodes vaporariorum* Westw., обыкновенный паутинный клещ *Tetranychus urticae* Koch., минирующая муха *Liriomyza* sp.) к *M. anisopliae* и *P. fumoso-roseus*. В результате у всех перечисленных насекомых была выявлена определенная степень восприимчивости. Высокая биологическая эффективность (83,1%) отмечена при применении *P. fumoso-roseus* против тепличной белокрылки [17], что вполне согласуется с сообщениями ряда авторов о наличии активности у *P. fumoso-roseus* и *M. anisopliae* по отношению к этому вредителю и успешном применении в борьбе с ним [4, 13, 15, 20, 22]. На основании результатов проведенной предварительной оценки вирулентности и анализа литературных сведений использование местных штаммов *P. fumoso-roseus* и *M. anisopliae*, высокоактивных по отношению к тепличной белокрылке, в качестве агентов биологического контроля численности этого вредителя представляется нам перспективным и актуальным. В настоящем сообщении приводятся результаты исследований по поиску, выделению энтомопатогенных грибов *M. anisopliae* и *P. fumoso-roseus* из природных биоценозов Беларуси и последующей оценке энтомопатогенных свойств с целью определения возможности их использования как продуцентов микроинсектицидов.

Материалы и методы исследования

При проведении в 1998 г. поиска энтомопатогенных грибов *M. anisopliae* и *P. fumoso-roseus* сбор почвенных образцов вели на территории Витебской, Минской и Брестской областей. Выделение грибов из почвы вели согласно методу "насекомого-ловушки"

[25] с использованием гусениц большой вощинной моли *Galleria mellonella* L. при постоянной температуре (26 °С). Выделение чистых культур грибов проводили в соответствии с рекомендациями А.А. Евлаховой [3] и "Большого практикума по микробиологии" (под ред. Г.Л. Селибера) [1]. При идентификации выделенных штаммов использовали руководства Евлаховой А.А. [3], Коваль Э.З. [7], Литвинова М.А. [10]. Изучение морфологических особенностей проводили при культивировании на агаризованных питательных средах (среда сусло-агар, среда Чапека). При определении вирулентности выделенных штаммов для лабораторного тест-объекта (большой вощинной моли) гусениц инфицировали путем погружения в водную суспензию конидий с титром $5 \cdot 10^8$ /мл. Зараженных насекомых содержали при постоянной температуре (26 °С). Погибших гусениц помещали во влажную камеру при 26 °С. Итоговый учет гибели проводили на 21-е сутки после заражения. Сравнительную вирулентность штаммов для личинок тепличной белокрылки (II-III возраст) определяли в вегетационных опытах: растения фасоли, заселенные вредителем, однократно обрабатывали водной суспензией конидий. Титр суспензии — $1 \cdot 10^9$ спор/мл. В контрольном варианте растения обрабатывали водопроводной водой. Итоговый учет численности вредителя проводили на 15-е сутки после обработки. Определяли биологическую эффективность действия [8]. Среднелетальную концентрацию ($ЛК_{50}$) суспензии конидий для личинок белокрылки определяли в вегетационных опытах согласно общепринятой методике: растения фасоли, заселенные одновозрастной популяцией вредителя (личинки II-III или IV возраста), обрабатывали однократно водными суспензиями конидий различной концентрации, учет гибели вредителя проводили на 15-е сутки после обработки [8].

Результаты исследований

Создание любого биологического препарата — многостадийный процесс. В целом, обобщая разработки различных авторов [8, 9], схему отбора перспективных штаммов-продуцентов грибных препаратов можно представить следующим образом: выделение первичных изолятов из природы, их идентификация, отбор колоний гриба по морфологическим признакам при росте на агаризованных средах, по продуктивности и синхронности конидиеобразования. Вирулентность наиболее продуктивных изолятов определяют на лабораторном тест-объекте, окончательное суждение об энтомопатогенных свойствах выносят после тестирования его на целевом виде вредителя. При проведении исследования мы посчитали целесообразным придерживаться данной схемы.

В ходе выделения *M. anisopliae* и *P. fumoso-roseus* из почвенных образцов было проанализировано 369 гусениц, погибших от микозов: гибель 163 из них была вызвана *P. fumoso-roseus*, 3 — *M. anisopliae*, 18 — *B. bassiana*. В чистую культуру выделены 2 штамма *M. anisopliae* и 11 — *P. fumoso-roseus*.

Таблица. Сравнительная вирулентность местных штаммов *P.fumoso-roseus* для личинок тепличной белокрылки (II-III возраст)

Вариант	Численность личинок, особей/ поле зрения бинокля (увеличение×4)		Биологическая эффективность, %
	до обработки	на 15-е сутки после обработки	
Контроль	19	19	
П97	13	5	62
3/1	16	3	81
7/5	11	3	73

Ряд авторов [2, 14] сообщает о корреляции между морфолого-культуральными особенностями и высокой вирулентностью: колонии высоковирулентных штаммов отличаются плоской порошистой поверхностью, низким воздушным мицелием, обилием спор. К тому же наличие подобных свойств дает основание предполагать, что штамм будет обладать высокой продуктивностью в условиях массового культивирования. В результате изучения характера роста выделенных штаммов на агаризованных средах вышеперечисленные особенности морфологии нами были отмечены у следующих: *P.fumoso-roseus* 1/3, 2/4, 4/1, 7/5 и 7/6 и *M.anisopliae* П97, 8/1 и 8/2.

Согласно литературным сведениям [6, 12, 16] большая часть выделяемых из природы штаммов мускардинных грибов обладает низкой патогенностью. Поэтому следующим этапом после выделения из природы, идентификации и отбора по морфологическим признакам было определение сравнительной вирулентности по отношению к лабораторному тест-объекту — гусеницам большой воцинной моли (*Galleria mellonella* L.). Оценивали энтомоцидную активность 14 штаммов. Гибель тест-объекта варьировала в пределах от 0 до 40%. Установлено, что наиболее активными являлись штаммы *P.fumoso-roseus* П97, 3/1 и 7/5, вызвавшие гибель 29,6; 40,0 и 27,8% насекомых соответственно.

На следующем этапе определяли вирулентность 3 отобранных штаммов *P.fumoso-roseus* (П97, 3/1 и 7/5) для целевого объекта — тепличной белокрылки. Активность их по отношению к личинкам II-III возраста была высокой: биологическая эффективность на 15-е сутки составила 62,4-81,1% (табл.). Результаты оценки вирулентности для личинок белокрылки коррелировали с полученными данными о таковой для гусениц большой воцинной моли (рис. 1): наибольшей активностью также обладал штамм 3/1, его биологическая эффективность составила 81,1%. Начало гибели личинок во всех вариантах отмечали на 7-е сутки после обработки: тело насекомых утрачивало прозрачность, становилось матовым, высохшим, отдельные особи были покрыты налетом мицелия со спороношением. Число личинок с признаками гибели от мускардиноза с течением времени увеличивалось. На 15-е сутки после обработки в вариантах с применением штаммов 3/1 и 7/5 большинство погибших личинок было покрыто мицелием со спороношением, что может служить условием для дальнейшего распространения и циркуляции патогена в популяции вредителя.

Одной из важнейших характеристик продуцента микоинсектицида является значение среднелетальной концентрации (ЛК₅₀) — титр суспензии спор, которая вызывает гибель 50% особей вредителя. Определены значения ЛК₅₀ штамма *P.fumoso-roseus* 3/1, как наиболее вирулентного по отношению к тепличной бело-

Рис. 1. Определение ЛК₅₀ *P.fumoso-roseus* 3/1 для личинок тепличной белокрылки II-III возраста

Рис. 2. Определение ЛК₅₀ *P.fumoso-roseus* 3/1 для личинок тепличной белокрылки IV возраста

крылке (рис. 1-2). Для личинок II-III возраста она составила 0,7 млрд. конидий/мл, для личинок IV возраста – 5 млрд. конидий/мл. Установленные значения среднелетальной концентрации могут служить основанием для расчета дозы расхода при практическом применении *P.fumoso-roseus* против тепличной белокрылки.

Следует отметить наличие у штамма *P.fumoso-roseus* 3/1 активности по отношению к личинкам IV-го возраста (нимфам). Указанная особенность штамма 3/1 — весьма перспективна и требует дополнительного изучения, так как тепличная белокрылка на нимфальной стадии развития является наиболее устойчивой к действию химических инсектицидов и мало восприимчивой к патогенам [4].

Таким образом, в результате проведенного поиска мускардинных грибов *M.anisopliae* и *P.fumoso-roseus* в биоценозах Беларуси и первичного скрининга их энтомоцидной активности для дальнейшего изучения отобраны 3 штамма *P.fumoso-roseus* — перспективных продуцента микоинсектицидных препаратов. Предполагается проведение дальнейшего изучения их биологических и патогенных свойств с целью разработки оптимальных методов культивирования и применения.

Литература

1. Большой практикум по микробиологии // Т.В.Аристовская., М.Е.Владимирская, М.М.Голлербах и др.; Под ред. Г.Л.Селибера. — Москва: Высш. школа, 1962. — 492 с.
2. Евлахова А.А. Микозы вредных насекомых.: Автореф.... д-ра.биол.наук.: 06.01.11 / ВНИИ защиты растений. — Пушкин, 1969. — 36 с.
3. Евлахова А.А. Энтомопатогенные грибы. — Ленинград: Наука, 1974. — 277 с.
4. Защита тепличных и оранжерейных растений от вредителей: Справочник / С.С.Ижевский, А.К.Ахатов, К.Н.Олейник и др.; Под ред. С.С.Ижевского, А.К.Ахатова. — Москва: КМК Scientific Press Ltd. — 1999. — 399 с.
5. Иващенко И.И. Беспестицидная технология защиты сельскохозяйственных культур от жуков-щелкунов // Производство экологически безопасной продукции растениеводства. Региональные рекомендации. — Пушино, 1996. — Вып. 2. — С. 203-210.
6. Ильичева С.Н., Алешина О.А., Кононова Э.В. и др. О естественной изменчивости гриба *Beauveria bassiana* (Bals.) Vuill. // Тез. докл. координационного совещания по микробиологическим препаратам для сельского хозяйства, Москва, 1972. — Москва, 1972. — С. 71-72.
7. Коваль Э.З. Определитель энтомофильных грибов СССР. — Киев: Наук. думка, 1974. — 260 с.
8. Король И.Т. Микробиологическая защита растений: Справочник. — Москва: Колос, 1993. — 79 с.
9. Лаппа Н.В., Гораль С.В., Халев И.Л. Отбор штаммов *Beauveria bassiana* для разных способов производства биопрепарата // Актуальные проблемы биологической защиты растений: Тез. докл. научн.-практ. конф., Минск, март 1998 г. — Минск, 1998. — С. 74-75.
10. Литвинов М.А. Определитель микроскопических почвенных грибов. — Ленинград: Наука, 1967. — 303 с.
11. Нелен Е.С. Использование перспективных энтомопатогенов для создания искусственной эпизоотии в плодовых насаждениях // Пути дальнейшего совершенствования защиты растений в Белоруссии и республиках Прибалтики: Тез. докл. научн.-произв. конф., Минск, февраль 1979 г. — Минск, 1979. — Ч. II. — С. 87-88.
12. Огарков Б.Н. Вирулентность штаммов гриба *Beauveria bassiana* (Bals) Vuill // Микробиологические методы защиты растений: Тез. докл. 1-й Всесоюзн. научн. конф., Кишинев, октябрь 1976 г. — Кишинев, 1976. — С. 112-113.
13. Павлюшин В.А. Научные основы использования энтомопатогенов и микробов-антагонистов в фитосанитарной оптимизации тепличных агробиоценозов: Автореф.... д-ра биол. наук: 06.01.11 / Всеросс. НИИ защиты растений. — С.-Петербург — Пушкин, 1998. — 66 с.
14. Примак Т.А. Методика получения и отбора стабильных штаммов гриба *Beauveria bassiana* (Bals.) Vuill. для производства биопрепарата боверина // Биологический метод борьбы с вредителями растений: Сб. ст. / Под ред. Я.П.Циновского — Рига, 1968. — С. 159-163
15. Сосновска Д. Биофизиологические особенности энтомопатогенных грибов рода *Aschersonia* и *Paecilomyces fumoso-roseus* в связи с биологической защитой растений от сосущих вредителей (Homoptera: Aleyrodidae, Aphididae): Автореф.... канд. биол. наук: 06.01.11 / ТСХА — Москва, 1990. — 20 с.
16. Тюльпанова В.А., Тюльпанов В.Г. Сибирские штаммы мускардиновых грибов // Патогенные микроорганизмы вредителей растений: Мат-лы симп., Рига, октябрь 1972 г. — Рига, 1972. — С. 33-35.
17. Янковская Е.Н. Оценка биологической активности мускардинных грибов *Paecilomyces fumoso-roseus* (Wize) Brown et Smith и *Metarrhizium anisopliae* Metch. по отношению к вредителям защищенного грунта // Защита растений: Сб. научн. тр. / БелНИИ защиты растений. — Минск, 2000. — Вып. XIX/XXIII. — С. 169-174.
18. Castenieras A., Pena J.E., Duncan R., Osborne L. Potential of *Beauveria bassiana* and *Paecilomyces fumoso-roseus* (Deuteromycotina: Hyphomycetes) as a biological control agents of *Thrips palmi* (Thysanoptera: Thripidae) // Fla. Entomol. — 1996. — Vol. 79, № 3. — P. 458-461.
19. Gindin G., Barash I., Raccah B. et al. The potential of some entomopathogenic fungi as biocontrol agents against the onion thrips, *Thrips tabaci* and the western flower thrips, *Frankliniella occidentalis* // Folia Entomol. Hung. — 1996. — Vol. 57, Suppl. — P. 37-42.
20. Lindquist R. Microbial control of greenhouse pests using entomopathogenic fungi in USA // IOBC / WPRS Bull. — 1996. — Vol. 19(9). — P. 153-156.
21. Sosnowska D. Possibilities of using the entomopathogenic fungus *Paecilomyces fumoso-roseus* in glasshouse pest control depending on temperature and humidity // Efektywnosc i praktyczne zastosowanie zwalczania biologicznego w ochronie roslin: Materiały z Sympozjum na temat, Skierniewice, marc 1997. r. —

Skierniewice, 1997. – P. 117-124.

22. Sosnowska D., Piatkowski I. Efficacy of entomopathogenic fungus *Paecilomyces fumoso-roseus* against whitefly (*Trialeurodes vaporariorum*) in greenhouse tomato cultures // IOBC / WPRS Bull. – 1996. – Vol. 19(9). – P. 179-182.

23. Vestergaard S, Gillespie A.T., Eilenberg J. Control of western flower thrips *Frankliniella occidentalis* (Thysanoptera: Thripidae) in gerbera by incorporating the entomopathogenic fungus *Metarrhizium*

anisopliae into the growth medium // IOBC / WPRS Bull. – 1996. – Vol. 19(9). – P. 240-246.

24. Vidal, -C; Lacey, -L.A.; Fargues, -J. Pathogenicity of *Paecilomyces fumoso-roseus* (Deuteromycotina: Hyphomycetes) against *Bemisia argentifolii* (Homoptera: Aleyrodidae) with a description of a bioassay method // J.Econ.Entomol. – 1997. – Vol. 90, № 3. – P. 765-772.

25. Zimmermann, G. “Galleria bait method” for detection of entomopathogenic fungi in soil // Zeitch. angew. Entomol. – 1986. – № 2. – P. 213-215.